

## **İlaç aşırı duyarlılık reaksiyonlarında tanısal testlerle ilgili sorunlar ve testlerin tanısal değerleri**

### **Provokasyon testleri**

#### **Dr. Serap Özmen**

Kademeli provokasyon olarak da isimlendirilen İlaç provokasyon testleri, alerji pratiğinde genellikle bir ilaca allerjik olunması beklenmeyen durumda uygulanmaktadır. Deri testleri veya in vitro testleri pozitif olan hastalarda provokasyon testi önerilmez. Provokasyon testi doğru uygulandığında hastanın ilaca alerjik yanıtının değişmemesi avantaj olmasına karşın, gelecekte o ilacın tekrarlayan kullanımlarında olabilecek reaksiyonları ön göremez.

IgE aracılı ilaç reaksiyonu olan bir hastada provokasyon testi uygulamasında gelişebilecek olası anafilaksi gibi ciddi reaksiyonlar nedeniyle müdahale ekipmanı hazır bulundurulmalıdır. Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, DRESS sendromu ve akut jeneralize egzantematöz püstülozis gibi ağır kutanöz istenmeyen ilaç reaksiyonlarında şüpheli ilaçla provokasyon testinin o ilacın çok düşük dozlarında bile aynı reaksiyona neden olabileceği ve bu nedenle kontrendike olduğu unutulmamalıdır.