

Prof. Dr. F Yařar Anlar

## HİPEREOZİNOFİLİ

Kanda eozinofil sayısının artmış ( >500 eozinofil/ml ) olması tanısal alıřmaları gerektirir. Eozinofil dzeyininin yksekliđine bađlı dokularda eozinofil infiltrasyonu geriye dnř mmkn olmayan doku hasarlarına yol aabilir. Eozinofil yksekliđi genellikle helmintik parazit enfeksiyonları, atopik ve allerjik hastalıklar, ilaların yan etkilerine bađlı geliřir. Bunların dıřında adenokarsinom, Hodgkin hastalıđı, T hcreli lenfoma ve mastositozis gibi neoplastik hastalıklarda da eozinofili grlebilir. . ok nadir olarak bađıřıklık sistemini ilgilendiren hastalıklardan hiperimmunglobulin E sendromu ve Omenn sendromu da ayırıcı tanıda dřnlmelidir. Eozinofil sayısının uzun sre yksek seyretmesi organ tutulumu ile giden Churg-Strauss sendromu, kronik eozinofilik pnmoni eozinofilik gastrointestinal hastalıklar gibi olasılıkları akla getirmelidir. Bu sunuda eozinofiller, eozinofili nedenleri tanı yntemleri ve tedavileri zerinde durulacaktır .