



TÜRKİYE
ULUSAL ALLERJİ
VE KLINİK İMMÜNOLOJİ DERNEĞİ

ANAFİLAKSİ ACİL EYLEM PLANI

Hafif/Orta şiddetli reaksiyon belirtileri:

- Yüzde, dudaklarda ve gözde şişme
- Ağızda kaşıntı
- Deride kaşıntı, kurdeşen(ürtiker)

Eylem Planı:

- Hasta ile kalın, gerekirse yardım çağırın.
- Adrenalin Oto-Enjektör'ü hazır bulun-durun.
- Antihistaminik verebilirsınız.
- Acil durum irtibat / ebeveyn kişisini arayın.

Adrenalin Oto-Enjektör'ü Kullanımı



QR KODU OKUTARAK
ADRENALİN OTO-ENJEKTÖR PEDIATRİK
FORM UYGULAMA VİDEOSUNA
ULAŞABİLİRSİNİZ.



Hastanın astımı var ve öksürük/ hışıltı gelişti ise, adrenalin yapıldıktan sonra

verilebilir.

1. Alerji öyküsü bilinen ve şüpheli alerjenle temas öyküsü olan hastalarda, aşağıdaki tabloda bulunan bulgulardan en az ikisi

A. Deride kaşıntı, kabarıklık, kızarıklık, şişlik		B. Solunum sıkıntısı nefes darlığı, öksürük, hırıltı	
C. Çarpıntı hissi, fenalaşma, bayılma hissi/bayılma		D. Ani başlayan kramp tarzında karın ağrısı, bulantı, kusma	

ya da tek başına **nefes darlığı, boğazda sıkışma hissi, tansiyon düşmesi** varsa;

ANAFİLAKSİ İÇİN EYLEM PLANI

1. Hastayı sırtüstü yatırın – ayağa kalkmasına veya yürümesine izin vermeyin.



- Bilinçsizse (sol tarafa doğru), kurtarma pozisyonuna getirin.
- Nefes alıp vermede güçlük çekiyorsa bacaklarını uzatıp oturtun.

2. Yardım çağırın.



3. Solunum ve nabzını kontrol edin.



4. Hastanın kıyafetlerini çıkarmadan üst bacağının orta dış yan bölgesine Oto-Enjektör'ü dik açı ile uygulayın, en az 5 saniye bekleyin ve çıkarın. 10 saniye enjeksiyon bölgesine masaj yapın.

- Enjeksiyon öncesi hasarı en aza indirmek için hastanın bacağının hareketsiz kalması sağlanmalıdır.


5. 112'yi arayın, hastanın yanında kalın.



6. Acil durum irtibat / ebeveyn kişisini arayın



7. Yanıt yok ise ikinci Adrenalin Oto-Enjektör 5-15 dk sonra yapılabilir.



8. Hasta hastaneye transfer edilmeli ve gözetim altında tutulmalıdır.

